



La version électronique fait foi.



Annexe 1. Questionnaire sur les antécédents médicaux responsables de complications sévères chez les personnes atteintes par le Covid-19

Ce questionnaire sur les comorbidités concerne :

- toutes les femmes avant une AMP quelle que soit la prise en charge
- les hommes avant une intervention pour chirurgie testiculaire

Il ne concerne pas :

- les conjoints des femmes qui réalisent une AMP
- les hommes qui réalisent un bilan de spermologie diagnostique

Madame, Monsieur,

Ce questionnaire de recueil d'informations sur vos antécédents médicaux permettra à l'équipe pluridisciplinaire qui vous suit d'adapter au mieux votre prise en charge.

En remplissant ce questionnaire, vous engagez votre responsabilité personnelle. Une falsification des réponses peut avoir des conséquences graves pour votre santé.

Merci de signaler dans les plus brefs délais à l'équipe médicale qui vous prend en charge tout changement de votre état de santé.

Avez-vous une des maladies ou antécédents ci-dessous, ou êtes-vous dans l'une de ces situations ?

	Oui	Non
Hypertension artérielle compliquée		
Accident vasculaire cérébral		
Coronaropathie (infarctus du myocarde, angine de poitrine)		
Antécédent de chirurgie cardiaque		
Insuffisance cardiaque stades NYHA III ou IV		
Diabète insulino-dépendant non équilibré ou présentant des complications secondaires		
Pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (dont asthme sévère, ...)		
Insuffisance rénale chronique dialysée		
Cancer sous traitement		
Immunosuppression :		
- Vous prenez l'un des traitements suivants : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive		
- Infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm ³		
- Suite à un greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques)		
- Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement,		
Cirrhose au stade B de la classification de Child-Pugh au moins		
Obésité avec IMC > 30 kg/m²		
En cours de perte de poids rapide après une chirurgie bariatrique		
Antécédent personnel thromboembolique (phlébite, embolie pulmonaire)		
Thrombophilie asymptomatique à haut risque		
Syndrome des antiphospholipides symptomatique		